$10^{-1} = 0{,}1$

$10^{-2} = 0{,}01$

$10^{-3} = 0{,}001$

$10^{2} = 100$

$10^{3} = 1{,}000$

$10^{-3} = \frac{1}{10^{3}}$

Διαστατική ανάλυση

Θεμελιώδη:

Μήκος → L

Μάζα → M

Χρόνος → T

Διαστατικά η ταχύτητα γράφεται:

$$\text{Ταχύτητα} = \frac{\text{Μήκος}}{\text{Χρόνος}}$$

άρα: $v = \frac{L}{T}$ ή $[v] = [L \cdot T^{-1}]$

διαστατικός ορισμός ταχύτητας.

$1\,A^{o} = 10^{-10}\,m$ (διάμετρος ατόμου)

$1\,mm = 10^{-3}\,m$

$1\,mm^{2} = (10^{-3}\,m)^{2} = 10^{-6}\,m^{2}$

$1\,mm^{3} = (10^{-3}\,m)^{3} = 10^{-9}\,m^{3}$



όγκος αντικειμένου

$$\text{πυκνότητα} = \frac{\text{μάζα}}{\text{όγκος}}$$

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$1\ g/cm^3 = \frac{10^{-3}\ kg}{10^{-6}\ m^3} = 10^{-3+6}\ kg/m^3 \Rightarrow$$

$$1\ g/cm^3 = 1000\ kg/m^3$$

$$1\ cm = 10^{-2}\ m$$

$$1\ cm^3 = (10^{-2}\ m)^3 = 10^{-6}\ m^3$$

$kg/m^3 \rightarrow$ πυκνότητα αερίου

$g/cm^3 \rightarrow$ πυκνότητα υγρού ή στερεού.

Aбu. 11)

Б) $y = -2x + 2$

y	x
2	0
-2	2

$y = -4x + 2$

y	x
2	0
-6	2



Asu. 1.40)

$$\rho = d = \frac{m}{V}$$

a) $V = 84\,cm^3$

$m = 210\,g$

$$\rho = \frac{210}{84} = 2{,}5\,g/cm^3$$

ή $\rho = 2{,}5 \cdot 1.000 = 2.500\,Kg/m^3$

$1\,g/cm^3 = 1.000\,Kg/m^3$

β) $V_1 = ;$

$m_1 = 624\,g.$

$\rho_1 = 7{,}8\,g/cm^3$

$$\rho_1 = \frac{m_1}{V_1} \Rightarrow \frac{7{,}8}{1} = \frac{624}{V_1} \Rightarrow$$

$$\frac{7{,}8 \cdot V_1}{7{,}8} = \frac{624}{7{,}8} \Rightarrow V_1 = 80\,cm^3$$

Άρα $V_1 < V$

Ασκ. 1.41

$d_{υγρ} = 0,8\ g/cm^3$

$V_{υγρ} = 500\ cm^3$

α) $d_{υγρ} = \frac{m_{υγρ}}{V_{υγρ}} \Rightarrow$

$\frac{0,8}{1} = \frac{m_{υγρ}}{500} \Rightarrow m_{υγρ} = 400g.$

β) $m_{νερ} = 400g$

$d_{νερ} = 1\ g/cm^3$

$d_{νερ} = \frac{m_{νερ}}{V_{νερ}} \Rightarrow 1 = \frac{400}{V_{νερ}} \Rightarrow$

$V_{νερ} = 400\ cm^3$ (ενδεχομ)

ή 400mL

Θέση.

Η θέση γενικά είναι ένα διανυσματικό μέγεθος με αρχή ένα σημείο αναφοράς στο χώρο και πέρας (τέλος) το σημείο στο οποίο βρίσκεται το κινητό.

Π.χ. στον άξονα x'x η θέση του Μ προσδιορίζεται με δύο τρόπους.

Ο 1ος τρόπος είναι ο αλγεβρικός:

$x = +4\,m$ (αυτόν κυρίως χρησιμοποιούμε)



και 2ος τρόπος ο διανυσματικός:

$\vec{x} = \vec{OM}$ (όπως φαίνεται στο σχήμα).